EXERCICE N°1 : 25' 5 points

Soit f définie sur $[0, +\infty[\setminus \{e\}$ par : $f(x) = \begin{cases} x + \dfrac{1}{1 - \ln x} & \text{si } x > 0 \text{ et } x \neq e \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

1) a) Montrer que f est continue a droite en 0.

b) Etudier la dérivabilité de f a droite en 0. Interpréter le résultat graphiquement.

2) a) Calculer $\lim\limits_{x \to e^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to e^-} f(x)$. Interpréter les résultats.

b) Montrer que la droite $\Delta : y = x$ est une asymptote à ζ_f au voisinage de $(+\infty)$.

c) Etudier la position relative de ζ_f et Δ. **3)** Dresser le tableau de variation de f.

4) a) Déterminer une équation de la tangente D à ζ_f au point d'abscisse 1.

b) Soit h la fonction définie sur $]0 , +\infty[$ par $h(x) = x \ln x - x + 1$. Etudier le sens de variation de h et en déduire le signe de h(x). Déterminer alors la position relative de ζ_f et D.

5) Construire Δ, D et ζ_f.

EXERCICE N°2 : 25' 5 points

Soit définie sur $[0 , +\infty[$ par : $f(x) = \begin{cases} x \ln\left(1 + \dfrac{1}{x^2}\right) & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$.

On considère la fonction g définie sur $]0 , +\infty[$ par : $g(x) = \ln\left(1 + \dfrac{1}{x^2}\right) - \dfrac{2}{x^2 + 1}$.

1) a) Dresser le tableau de variation de g.

b) En déduire qu'il existe un unique nombre réel $\alpha > 0$ tel que $g(\alpha) = 0$. Vérifier que $0,5 < \alpha < 0,6$.

2) Déduire des questions précédentes le signe de g(x) sur $]0 , +\infty[$.

3) Montrer que pour tout $x \in]0 , +\infty[$ on a : $f'(x) = g(x)$.

4) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$. **5)** Etudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement.

6) Montrer que $f(\alpha) = \dfrac{2\alpha}{\alpha^2 + 1}$. Dresser le tableau de variation de f et tracer ζ_f, $(\alpha \approx 0,5)$.

EXERCICE N°3 : 30' 5 points

Soit g la fonction définie par : $g(x) = \dfrac{x + 1}{x - 3} + \ln|x - 3|$.

1) a) Etudier les variations de g.

b) Montrer que l'équation g(x) = 0 admet dans $]-\infty , 3[$ une solution unique α et que $\alpha \in]0.7 , 0.8[$.

c) Déterminer le signe de g.

2) Soit f la fonction définie par $f(x) = (x + 1) \ln|x - 3|$. **a)** Etudier les variations de f.

b) Calculer les coordonnées des points d'intersection de C_f et l'axe des abscisses.

c) Vérifier que $f(\alpha) = \dfrac{(\alpha + 1)^2}{3 - \alpha}$ et tracer C_f.

Qarray.tn Agra Blech Qarray.tn Agra Blech Qarray.tn